

16287. 47a

Sp. 11/01

315

400

DISCURSO
SOBRE A
HERNIA VULGAR
EM COMMUM;
E EM PARTICULAR
SOBRE A

OPERAÇÃO DA BUBONOCÉLE:
DA NECESSIDADE DE EMPREHENDELLA,
DIVERSIDADES DE CASOS,
E VARIEDADE DE CIRCUMSTANCIAS,
QUE NELLA CONCORREM:
COMPOSTO POR HUM PROFESSOR

ALUMNO DE CHIRONE,

Para dar em resposta a huma Carta, que lhe escreveo
certo Cirurgiaõ seu amigo, empregado nos
Exercitos

DE S. MAGESTADE FIDELISSIMA,

*Na qual pede ao Author algumas instrucções, regras, e aocumentos
para executar feliz, e methodicamente esta, ainda que difficil,
e melindrosa Operação; com tudo muito util, e em certos
casos totalmente indispensavel para a conservação
da vida do Homem.*



LISBOA. M. DCC. XCIX.

NA TYPOGRAPHIA REGIA SILVIANA.

Com Licença da Meza do Dezembargo do Paço.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1891


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO



DISCURSO

SOBRE A

HERNIA VULGAR.

NÃo sei como possa satisfazer aos vossos desejos , por ser o tempo breve , e a materia muito vasta : vós quereis que eu vos diga o meu parecer , sobre a enfermidade a que vulgarmente chamão Hernia : para vos obedecer seria preciso compôr hum Tratado ; pois no limitado espaço de hum Carta , ou Dissertação não he possível reduzir hum parte da Cirurgia , que só por si requer varios volumes. Não obstante , como as vossas instancias tendem a utilizar á humanidade , procurarei no discurso seguinte dar-vos talvez algumas luzes necessarias , que vos conduzaõ ao desejado fim de livrar da morte a hum nosso semelhante.

Ninguem póde lisongear-se de ficar isento de padecer a hernia , no discurso da sua vida , particularmente aquelles que se occupaõ em grandes trabalhos , e muito mais os Militares empregados nas laboriosas fadigas de Marte , a cuja assistencia vós estaes destinado como Cirurgiaõ. As Hernias são causa de varios incómmodos , e da morte , se senão soccorrem com os meios opportunos , ou operações

necessárias , que são das mais delicadas , e dignas de attenção na Cirurgia.

Divide-se a Hernia pelos AA. mais Classicos em Hernia *Congenita* , em Hernia *Vulgar* , em geral , e em particular.

Deveis contentar-vos , caro amigo , se por hora não fallo mais , que da Hernia vulgar em geral , e da Operação da *Bubonocèle* , a qual mais frequentemente se põem em execução.

Por Hernia vulgar em geral se entende todo , e qualquer tumor , que apparece em qualquer parte do abdomen ; produzido de huma viscera nelle contida , e fechada.

Divide-se esta , pela razão do lugar que occupa , naquella , que apparece áquelles lugares do ventre aonde não existe nenhuma abertura natural ; mas que os tegumentos , e musculos abdominaes , ou suas aponeurosis offendidas , debelitadas , e dilatadas , ou por huma lezaõ externa , ou por alguma doença , cedem , e se extendem em hum sacco herniofo , e se chamaõ *Hernias ventraes* , ou *Ypogastrocelle*. E tambem se dividem naquella donde o Peritoneo he aberto nos lugares ordinarios , para deixar passar os vasos spermaticos , os cordões redondos do útero , os vasos cruraes , e a veia umbilical no feto , e chama-se *Commun*.

O *Ypogastrocelle* se divide em interno , e externo. O interno he quando huma viscera do abdomen he puxada na cavidade do peito , ou quando os intestinos estão fechados dos anulos naturaes , e não naturaes do Mesenterio , sem darem nenhum signal externo da sua existencia : o externo he quando o tumor apparece claramente á vista , e ao tacto.

Para assegurar-vos da possibilidade do *Ypogastrocelle* interno , lêde Ildano , *Oper. cent. 2.³ Obs.*

33. pag. 108. O Riverio *Oper. omnia Obs. cent. 4. Obs. 67. pag. 536.* Bartolino *Histor. Anat. cent. 6. Hist. 55. pag. 288.* Pareo *Oper. Chirurg. Lib. IX. Cap. XXX. pag. 308.* Chauvel *Memoir. de l'Academ. Royal des Sciences, anno 1729. n. 11.*, e outros muitos, como Morgagni, Becher, de Haen Haller, e Bertrandi.

O externo he quando se manifesta aos lados do embigo, superior ou inferiormente delle á linha branca, a região ypogastrica, ou epigastrica immediato ao anulo inguinal, sobre a pube na vaginal dos testiculos dos musculos rectos entre os outros musculos do ventre, ou em outras partes do abdomen, os quaes não se distinguem com nomes particulares. Quem tratou particularmente d'estas hernias ventraes foi *la Chaussé Dissert. de Hern. Ventral. Haller disput. Chirurg. Tom. III. Diff. 68. p. 183.*

A hernia commua, que se forma nos lugares já ditos, he caracterizada com particulares nomes, segundo o lugar que occupa, e da viscera que a produz.

Pelo que respeita ao lugar que occupa se chama *Inguinal*, ou *Bubonocelle*, quando o tumor se manifesta á inguine: se este se prolonga ao scroto, chama-se *Scrotal*, ou *osceocelle*: se a hum lado da vulva *hernia dos labios da mesma*: se debaixo do ligamento do Puparcio na parte anterior, ou superior da coxa, *hernia crural*, ou *Meriocelle*: se ao embigo, *hernia umbilical*, ou *onfalocelle*, ou *exomfalo*.

Para ter o conhecimento daquellas que se formão em outras partes do abdomen, lede Barbeta *Oper. Chirurg. Anatom. Part. I. Cap. VII. p. 46.*, e o Haller *Disp. Chirurg. Tom. III. Disp. 73.*

A hernia adquire differentes nomes pela visce-
ra,

ra , que contém. Quando a hernia inguinal he produzida do intestino , se chama *Enterocelle* , se do Omento *Epiplocelle* , se do intestino , e Omento *entero-Epiplocelle* ; quando he no scroto *entero-osceocelle* , ou *epiplo-osceocelle* , e *entero-epiplosceocelle*. Quando he crural póde fer hum *entero-mereocelle* , hum *epiplo-mereocelle* , ou hum *entero-epiplomeroeelle*.

A hernia umbilical , que se deriva do intestino adquire o nome de *enteromfalocelle* : se do Omento *epiplomfalocelle* , se de hum , e outro *entero-epiplomfalocelle*. A ventral adquire tambem o nome da vilcera de donde vem formada , e a chamaremos *Ipogastrocelle-enterico* , ou *Ipogastrocelle-epiploico* , ou *Ipogastrocelle enterico-epiplocio*.

Os intestinos subtís mais frequentemente se fazem herniosos , o omento mais raras vezes , e muito mais raras vezes ainda os entestinos mais grossos : sobre isto lede o Palfino *Anat. Chirurg. part. V. Cap. X. pag. 440*. Morgagni *Epist. Anat. 34. Artic. 15. Epist. 43. num. 3*.

As ditas hernias se dividem em *solitaria* , e *multiplicada* , em *simples* , em *complicadas* , em *hereditarias* , em outras que tem *sacco* , e outras que o não tem , em *livre* , em *destroçada* , em *destroçada unida* , *inflammada* , e *gangrenosa*.

A solitaria he quando não ha mais que hum só tumor hernioso , a multiplicada quando ha mais de hum ; por exemplo quando está em hum , e outro anulo , vêde Hesitero *Ephemerid. Natur. Curios. cent. V. Obs. 83*. , quando a hernia Inguinal acompanha a crural , ou quando duas existem no mesmo lado , Arnaud *Memoir. de Chirurg. Tom. II. Observ. 26. pag. 605*. A simples se he huma vilcera só , ou duas sem o acompanhamento de outra enfermidade

local ; a complicada he quando he conjunta com outra indisposição , como o *Ydrocelle* , o *varicocelle* , o *cirsocelle* , e *sarcocelle* : a hereditaria he quando se descobre a hernia dos pais nos filhos ; de taes hernias daõ fé muitos AA. particularmente Il-dano *cent. VI. Obs. 73. pag. 592.* as que tem sacco , faõ aquellas , que faõ circundadas do Peritoneo extendido , e alargado , e não já dos seus processos , e puxado fóra das naturaes aberturas do Abdomen da viscera , que se faz herniosa , e faõ as mais communs. As que não tem sacco , quando são cobertas do sacco do Peritoneo , estas faõ raríffimas : lede o Mauchart. *Diff. de Hern. Incarcerat.*, Haller *Disp. Chirurg. Tom. III. pag. 83.* , e nas *Prælect. em Boerhav. Vol. V. Par. I. pag. 286.* ; estas porém tem lugar nas feridas penetrantes do abdomen , nas lacerações do Peritoneo , quando succedem pelos violentos exercicios do corpo , pelas compressões , golpes , ou rajadas graves do ventre. Por muito raros que sejam os casos das hernias , que não tem sacco , deve o Cirurgiaõ tê-lo em vista , quando faz a operação dita de Bubonocelle , a fim de proceder sempre lentamente no córte dos tegumentos por não ferir as vísceras conteúdas na hernia , se se achassem a contacto dos integumentos pela falta , ou laceração do sacco : a livre he aquella na qual a viscera , que a produz , entra , e sahe do ventre sem difficuldade nas varias situações do doente : a destroçada he , se a hernia persiste , e demonstra varios perigosos symptómas : a destroçada unida inflammada , ou gangrenada , he quando a viscera herniosa se tem unido ao sacco , ou ha signaes de inflammação , ou de gangrena.

A maior parte dos Escriptores daõ a razão da causa productiva da hernia no relaxamento , e fra-
que-

queza daquellas partes, que cobrem o ventre; e outros accrescentaõ, que ainda deva concorrer relaxaçaõ, ou distençaõ natural, ou morbosa do Mesenterio, ou do Omento, ou dos ligamentos das outras visceras.

As causas prodisponentes sãõ a má conformaçaõ, ou situaçaõ das visceras, a natural fraqueza dos seus ligamentos, que a sustentaõ, e as circundaõ, a infancia, a idade senil, a disposiçaõ hereditaria, o Ydrocelle congenito, a frequente gravidaçaõ, o corte Cesareo, e as feridas, e contusões do Abdomen, e da demasiada corpulencia, a summa magreza do corpo depois de huma extrema gordura, o abuso das bebidas quentes, aquosas, ou de banhos quentes, ou de alimentos relaxantes muito grossos, e oleosos; o viver em hum ar humido, os incómmodos, movimentos lateraes, ou posteriores do corpo nos quaes os musculos abdominaes estãõ em huma violenta extensaõ, as visceras comprimidas, e puxadas em baixo, e as naturaes aberturas do ventre, maximamente aquellas debaixo do ligamento do Puparcio, e do anulo, que sãõ summamente dilatadas.

As causas que daõ occasiaõ, sãõ todas aquellas que agitaõ com força as visceras do Abdomen, e as obrigaõ com violencia em baixo, e contra as envolturas do ventre, taes sãõ os saltos, o canto, o riso, a declamaçaõ forte, o espirro, a toce, vómito, o cahir de hum lugar alto em pé, ou sobre as nadeegas, as cólicas ventosas, as fortes inspiraçoẽs, que se fazem para levantar, ou atirar com corpos pezados, ou partos difficultosos anticipados, ou tocar instrumentos de vento, as ligaduras, e espartilhos summamente apertados ao peito, e ao Abdomen, a respiraçaõ difficultosa, o sus-
to

to grande , o andar a cavallo com incómodo, os vehementes esforços para parir , sacodem , agitaõ em muitos modos as vísceras , e as obrigaõ com força para as suas envolturas , e relaxaõ os seus ligamentos ; ora se os mesmos obraõ lenta , e successivamente , dilataõ o Peritoneo. Se violentamente , ou de repente , promovem a sua laceraçaõ.

Os signaes da Hernia livre , se dividem em geraes , e em particulares. Os primeiros saõ hum tumor , que se manifesta no embigo ao anulo , e a dobradura da coxa , ou a qualquer outra parte do Abdomen. E maiormen te nos assegura ser huma Hernia , quando o tumor he indolente , que desapparece , se o doente se deita horizontalmente , e torna , se se indireita em pé ; quando cresce , e se engrossa , quando tosse , quando espirra , salta , ou anda a cavallo ; no demorar a respiraçaõ , ou em qualquer outro movimento de força com o corpo , ou naturalmente , e a pouco a pouco , que chega algumas vezes a hum tamanho grandissimo , quando se comprime com a maõ se faz mais pequeno , dezincha , diminue , desapparece , e se perde no ventre ; mas tirada a pressaõ torna de novo prompta , ou lentamente , se o doente retém , ou naõ a respiraçaõ. Quando se engrossa , se estende , ou incha , depois de comer , com sinaes de dores , e rugidos na sua cavidade , e depois dalli a algumas horas , ou depois do somno desapparece , se perde , ou se faz mais mole ; e finalmente quando he permanente por algum tempo , he causa de varias molestias de flatolencia , distençaõ , dôres de ventre , insultos frequentes , cólicas , vômitos , e difficuldade no obrar.

Os sinaes particulares saõ aquelles , que caracterizaõ as varias já nomeadas especies de hernias ,

aos quaes se reduzem parte dos finaes geraes , e parte dos do tacto.

Quando he intestinal se observa hum tumor ao inguine á parte superior do scroto , á dobradura da coxa , ao embigo , e a outras partes do ventre , mais ou menos grosso , e comprido em proporção á quantidade do intestino , que cahio na hernia ; redondo , lizo , elastico , igual , quando está estendido do ar , ou desigual anguloso , se he produzido dos escrementos endurecidos ; o tumor he estreito para a sua origem , ou largo para o seu corpo , cuja dureza e tenção crescem nos impulsos da tosse , do espirro ; depois de comer , ou de declamar , depois de huma forte respiração , ou qualquer outro esforço ; este he huma vez com rugidos , outra não ; e se comprime suavemente com a mão para a sua origem , de ordinario se desvanece mais , ou menos facil , e promptamente com rugidos , segundo que a via de donde sahio , he mais , ou menos larga , ou o tamanho do intestino hernioso menor , ou maior. Disse que de ordinario se desvanece ; porque succede , que o intestino não póde ser reconduzido no ventre , ou por ter apparecido huma inflammação , ou hum restringimento spasmodico do anulo , ou do collo do sacco hernioso.

Se a hernia he produzida do Omento , o tumor he molle , desigual , lubrico , e geralmente mais indolente , prolongado , e não redondo , nem periforme como no intestino , difficulosamente desapparece , e retrocede com o Taxis na situação vertical do doente , em quanto que na horizontal desapparece naturalmente sem motivar rugido algum , e torna immediatamente na vertical ; finalmente se conhece tambem do pezo , que causa quando he grande , de não queixar-se o doente de nenhuma
dôr

dôr colica na hernia, do vômito, que lhe sobrevem depois de hum abundante jantar, quando está direito em pé, ou dobra o corpo posteriormente, porque nesta posição o estomago he sacudido, e puxado para baixo do pezo do Omento.

A hernia formada do intestino, e do Omento ou de outra viscera, tem sinaes menos claros das outras duas; conjectura-se porém da desigualdade do tumor, da diminuição prompta de hum parte delle nas primeiras tentativas, que se fazem para repollo; posto que o intestino entra no ventre produzindo hum murmuro, e o Omento fica na hernia, o qual depois se conhece dos sinaes já indicados.

Os sinaes da hernia destrocada, são muitos, e diversos; mas eu pertendo demonstrar só aquelles, que são proprios sómente das hernias do intestino, e do Omento.

Quando ha hum porção grande de intestino, que fica fechado, os sinaes em geral são os seguintes: hum dôr gravosa, e viva ao tacto no lugar do tumor, o que he duro, tezo, e resistente; o soluço, a cólica, que principia na hernia, e se espalha por todo o ventre; a difficuldade no obrar acompanhada alguma vez na dissuria; o vômito das materias chilosas depois belliosas, e feccaes; alguma vez a febre, a desinquietação, o abatimento das forças, a convulção, a gangrena do tumor, e a morte no caso, que esteja já destrocada hum pequena parte do intestino: o curso das fezes de ordinario he livre pela via do ano, e se ha difficuldade no obrar as mézinhas emolientes, ou estimulantes as mais das vezes são proveitosas. Quando nesta circumstancia se tem achado o corpo livre, tem succedido enganar-se julgando antes hum cóli-

ca accidental , ou huma inflammação dos intestinos em lugar de huma hernia destroçada , e de hum *Misderere* , quando se achou difficuldade no obrar. Os outros symptómas são os mesmos da hernia grande , porém não constantes na intençaõ , alguma vez são vivos , grandes , e ameaçadores de huma universal inflammação , e huma corrupção da restante parte intestinal : outras vezes são menos vivos esforços , que podem fazer suppôr huma cólica , e depois ver-se com surpresa a gangrena , e esta tomar posse da parte , e sahirem os excrementos.

No Omento destroçado de ordinario os symptómas são menos vivos , e molestos , do que aquelles do intestino : o doente se doe de huma oppressão na região do ventre , he molestado da nauzêa , e da cólica na região umbilical , e alguma vez a hum lado dos lombos ; tem o corpo livre , (se bem que o ventre esteja arqueado , e doloroso) não póde estar direito em pé , nem na cama com o corpo estendido , inda que a hernia não seja umbilical. O tumor hernioso , ou seja grande , ou pequeno faz-se doloroso ao tacto , não he elastico , nem tão duro , e resistente como no destroçamento intestinal.

Ao destroçamento da hernia sobredita prescrevo as seguintes causas ; a fechadura do anulo , a fechadura do sacco hernioso , o envolvimento das visceras entre si , e acomprehenção de huma viscera com outra.

A fechadura do anulo he a causa mais frequente do destroçamento da hernia , como se vê na operação do Bubonocelle , que de ordinario não tornaõ a entrar as visceras , que estão fóra senaõ depois de dilatado , ou cortado o anulo. Alguns negaõ que o anulo possa fechar-se. Porém basta para fazer nascer o destroçamento , que a viscera hernio-

fa

fa inche, e tire a porporção que tinha entre ella, e o lume do anulo. A inchação desta póde succeder da impedida passagem das materias contheúdas no intestino, como são; as fezes, as substancias chilo-
sas, e outros corpos como lereis em *Petit. Trait. de Malad. Chirurg. Tom. II. pag. 280.*, e nas *Memorias de Cirurgia de París. Tom. III. pag. 197.* em 12.

Hum tal destroçamento divide-se em Chronico, e agudo, o Chronico he proprio das hernias grandes, e antigas nas quaes ha relaxação, tanto das fibras intestinaes, como dos musculos abdominaes por onde as fezes se introduzem sem difficuldade no intestino cahido no scroto, e não podendo tornar outra vez a entrar no ventre pela languida acção já dita, se demoraõ, indurecem, e distendem os intestinos de modo de não poder-se mais repôr; de que nasce a uniaõ entre si, a dôr, a inflammação, e a gangrena: o destroçamento agudo se manifesta nas hernias novas, e quasi de repente depois que estas apparecem, este póde ser spasmodico, ou inflammatorio. No spasmodico o doente prova huma sensa-
ção de irritação, e huma ligeira cólica no lugar do tumor, cujos males duraõ por algum tempo, e depois se diminuem, ora de repente, ora lentamente.

Depois da tregua, tornaõ de novo ao lugar do tumor, e se espalhaõ a todo o abdomen, e assim alternativamente cessaõ, e tornaõ até que accompanhaõ a tenção. E a dor do abdomen pela augmentada contracção poderia por si só accrescentar aquella do anulo, e o destroçamento.

O destroçamento inflammatorio se declara com huma dôr aguda, e com pouca inchação do tumor hernioso: a febre se accende, e de repente a hernia se engrosa, faz-se têza, elastica, e dolorosissi-
ma.

ma á pressão : o ventre se incha , porém he elastico , a lingua secca , e o doente he atormentado da sede , da cólica , e de hum calor intenso no ventre ; sobrevém o vômito , huma difficuldade em obrar invencivel , as convulsões , e a gangrena , se promptamente não se tiraõ de embarço as visceras destrocadas. A immediação da gangrena he demonstrada da dôr , que não he já vaga pelo abdomen , mas sim fixa , e constante no lugar da hernia ; logo que nasce a gangrena se conhece do pulso concentrado , pequeno , fraco , e intermitente ; do vômito , que se tem sem esforço , do desenchamento do ventre , e da hernia , da sahida alguma vez das fezes pelo ano , da cessão das dôres , e do abatimento das forças do rosto ; da vista fraca , e triste , da hernia que descóra , se faz mole , cheia , indolente , e edematosa , depois de côr fusca , lívida , preta , e cuberta de burbulhinhas mais , ou menos grandes , cheias de humor amarello , fusco , e preto. Todos estes symptómas tão promptos , e temiveis , que reduzem os doentes á morte , são dependentes não só da gangrena da visceras destrocada , a qual não he sempre causa dos ditos effeitos , e da morte ; mas antes de huma verdadeira affecção spasmodica de todos os sólidos , e principalmente das visceras vitæ sobre as quaes os nervos intestinaes tem hum grandissimo influxo , como o approva Heister *Diff. de Hern. incancerat. sæpe non lethali* : Haller *Disput. Chirurg. Tom. III. disput. 60. e 70.* O conhecimento do destrocamento spasmodico conduz ás pessoas previstas na Arte , a servir-se de remedios quentes , relaxantes , locaes , do banho universal , das sangrias repetidas , das bebidas oleosas , e do uso do ópio ; como o prescreve o Tralles , *De opio Sect. 2. pag. 265. e Vans Wiëten. §. 422. pag. 745.*

A fechadura do sacco hernioso póde ser causa do destroçamento da hernia ; este póde ter principio na origem , e no corpo do sacco : segue o destroçamento para a origem , e no cólo do sacco , quando este não conserva mais a sua molleza natural , flexibilidade , e subtilidade ; porém tem-se feito duro resistente , e caloso que fecha , e comprime as partes contidas na sua cavidade : vêde *Ledran Observ. de Chirurg. Tom. II. observ. 57. pag. 1. obs. 58. pag. 6. la Faye no Dionis. Cour. des operat. pag. 324. Not. l. a. Hevin. Patolog. & Therapeut. pag. 377. ,* também o *Journal de Medicin. Chirurg. Tom. XXXV. Janv. Juin. : ann. 1771.*

O destroçamento , que nasce do corpo do sacco succede raras vezes , e só quando o sacco se rompe , e as visceras sahem , e se achão ao tacto com os tegumentos , e os labios do sacco , e por huma certa actividade de contrahir-se das fibras irritadas , ou de engroçar-se , e fazer-se tefas sobre-vem a inflammação , e podem destroçar , e fechar as visceras herniosas.

O envolvimento das visceras também he causa do destroçamento , e observa-se quando he hum *Entero-epiplocelle* , ou que o Omento se envolve á roda do intestino , e o fecha , ou o liga : a hernia deste caracter póde ser reposta com facilidade , porém , se depois da reposição os sinaes do destroçamento subsistem ; precisa-se fazer sahir outra vez a hernia pondo em pé o doente , e fazendo-o espirrar , tossir , saltar , e outros esforços. Não tornando a apparecer a hernia , se passa immediatamente á abertura do sacco para desdobrar as visceras envolvidas.

O destroçamento da compressão de huma vis-
cera contra a outra , tem lugar no *entero-epiplocel-*
le ,

le, quando o Omento se engrossa, ou indurece ao lugar do anulo; e comprime, e toma o intestino. Esta especie de destroçamento a notou o *Pott*.

O prognostico da hernia se deduz da natureza da mesma, se he livre, ou destroçada.

Se he livre, se conhecerá da constituição do doente, da diversa grandeza, do tempo, da existencia das causas da hernia, das partes que a produzem, e das suas varias complicações.

Da constituição do doente: os meninos, a idade Juvenil, o temperamento são, como tambem o não ser acompanhada da ydrocelle, variocelle, e sarcocelle, facilitaõ muito a cura da hernia.

Do differente tamanho, a hernia grande não he sempre de cura impossivel. *Yldano Cent. VI. obs. 70. pag. 587. Arnaud. Traët. des Hern. Tom. II. pag. 135.*

A hernia antiga he de cura mais difficultosa que a nova, pois na nova as partes não são muito distrahidas, e podem tornar a adquirir a natural, e propria firmeza.

As hernias derivadas de cousas lentas são mais resistentes á curá, do que aquellas que se formaõ immediatamente.

A hernia intestinal, he de cura mais facil, do que todas as outras, porque o mesenterio he mais capaz de accommodação, do que por outro ligamento das visceras do Abdomen. A Omental he mais difficultoso retella no ventre pela sua lubricidade, e subtileza. *Arnaud Memoir. de Chirurg. Tom. II. pag. 460. e art. 12. pag. 52. Artig. 13. pag. 528.*

A complicação da hernia accresce infinitamente a difficultade da cura, especialmente quando he conjuncta com *Cirfocelle*, pois que exclue a com-
pre-

preção pelo destroçamento dos vasos, que recebem o sangue do testiculo.

Se he destroçada, o prognostico he geralmente perigoso, o que rezulta maior, ou menor da qualidade, do numero das visceras destroçadas, do tempo, da idade, e temperamento do fujeito, da especie, e do lugar do destroçamento.

A qualidade das visceras destroçadas faz ser differente o prognostico. A hernia do Omento, he quasi sempre menos perigosa, que a intestinal, por ser menos sensivel, e menos necessaria a vida. Não deixa com tudo ainda esta de ter os seus inconvenientes, como vereis no Arnaud *Memoir de Chirurg.* Tom. II. Pag. 460. 480. Obs. XV. pag. 536.

O Numero das visceras destroçadas, tambem faz o prognostico differente; pois a hernia do intestino, e do Omento he menos perigosa, do que aquella do intestino só; em quanto o Omento cobre o intestino, e deffende com a sua moleza, e lubricidade da forte fechadura do anulo. *Heister de Hern incarcerat* §. VI. pelo que os symptomas da inflamação, supuração, gangrena, e sfacelo apparecem mais tarde; e dão tempo a subministrar-lhe os soccorros oportunos.

O tempo da hernia contribue muito: a antiga, e grande he menos perigosa; porque o anulo he muito estendido, e a força de contra-acção, he muito debil e languida: aquella, que nasce de proximo he mais perigoza, por ser o anulo mais estreito, e elastico; e a penas a hernia tem apparecido, a fecha, a aperta, e produz huma formidavel inflamação: A hernia Omental tanto antiga como moderna he menos mortal, do que a só intestinal, pela sua pouca sensibillidade: *Marcheti Obser. Medic. Chirurg. Rar. Observ.* 54. pag. 121. A ida-

de, e temperamento que faz com que nos meninos moços, e pessoas debeis os accidentes não sejaõ geralmente tão promptos, e perigosos; com tudo ás vezes com pequena febre, e poucas dores apparece a corrupção, e gangrena, e isto nos fará mais acautellados, para emprender a opperação, ainda quando os symptomas não se mostrassem grandes, e vehementes.

A especie, e o lugar do destroçamento fazem variar o prognostico; este será perigosissimo na fechadura inflammatoria; pois as partes herniosas se unem juntas, ou ao sacco, e se gangrenão com muita brevidade; e em tal caso a opperação se deve fazer promptamente: menos perigoso he o destroçamento spasmodico, porque não he de muita duração; cede aos oportunos remedios, e muitas vezes sem a opperação; como tambem quando o destroçamento se deriva da redundancia dos excrementos; porque os symptomas crescem pouco a pouco, e não nasce o vomito bilioso, se não depois de dez, ou doze dias: porém ainda quando huns, e outros se ajuntem, os symptomas mudaõ de figura; pelo que o prognostico da hernia, se deve formar da sua maior, ou menor viveza, intensão, e promptidaõ. Pelo que respeita ao lugar, he mais perigoso, quando segue ao embigo, ou anulo, e ainda mais nas mulheres, porque o anulo he mais estreito.

Depois de tudo o dito até aqui, he necessario passar á cura, e primeiramente á

Da Hernia Livre.

A Cura da hernia intestinal livre, se obtem com a funda: A primeira tem lugar nos meninos, e se executa d'este modo. Depois de metida a hernia,

nia , se toma huma atadura de pano de linho , e esta se chama graduada composta de tres , ou quatro , huma maior do que outra , e posta huma sobre a outra , e cosidas juntas , resultando hum corpo de figura Conica cortada , a ponta da qual se põem sobre o anulo , e se assegura com a ligadura á espiga , mudando-a todas as vezes , que estiver cuja ; em lugar da dita atadura , se pode uzar de hum saquinho , metade cheio dos poz da casca , ou de flores de carvalho , molhado o saquinho em vinho quente , e banhando-o por varias vezes ao dia e sempre assegurado da ligadura. *Buchan. Medecin. Domest. Tom. IV. pag. 310.*

As fundas , que são as mais simples , são as preferiveis , e particularmente as elasticas , cuja força compressiva ha de ser porporcionada á idade , e ao genero de vida do doente , á especie da hernia , e á sua antiguidade , e grandeza : a hernia do Omento exige huma compressão maior , que aquella do intestino ; porque estes fogem pela sua lubricidade como diz *Juvillet Tract. de bandag. herniair.*

He incerto o tempo , que a natureza impregna na cura da hernia : nas creanças , e nos moços se faz , em seis ou oito mezes , em outros mais tarde , e em muitos por toda a vida. A' Arte faltaõ-lhe signaes certos , para conhecer se he ou não seguida a cura ; com tudo isto , depois de ter uzado por muito tempo dos remedios já descriptos , poderá abster-se do seu uzo , na noite , e tambem no dia continuando assim por algum tempo ainda. Aquelles , que forem sугeitos a hernia , deverãõ abster-se de emprender laboriosas fadigas , violentos exercicios &c.

Para applicar a funda he perciso situar o doente orizontalmente na cama , as nadegas altas a fim

C ii

de

de favorecer a entrada das visceras no ventre : Se a funda , ainda que muito comprida , não mantem as visceras no ventre (isto he , quando o doente se levanta da cama , tosse , e espirra ,) então se recorra a fxa chamada suspensorio. Palfino *Anatom. Chirurg. Tom. II. pag. 126.* Se o doente for de temperamento delicado , e debil , se procura fortificalo com a mudança do ár , com o exercicio comodo , com o banho frio , com o uzo interno da quina , evitando os alimentos aquosos , e flatulentos , como os legumes , as ervages , os lacticinios , e gorduras. Quando esteja carregado de humores viscosos , ou lymphaticos , se empregão os atenuantes da limpha , os aperitivos , os diaforeticos , segundo as circumstancias ; advertindo tambem , que o corpo esteja livre , e facil , ou naturalmente , ou com o beneficio dos clisteres , e de purgantes segundo a necessidade. Atégora tenho fallado da cura da hernia intestinal livre ; passo agora a tratar

Da hernia encarcerada , e destroçada.

P Ara tirar o destroçamento da hernia , são muitos os meios curativos os quaes reduzo a dois ; o primeiro he quando se tira o destroçamento sem opperação , chamada da hernia encarcerada.

Se tira o destroçamento sem opperação pela situação do doente , pela redução da hernia com a mão , opperação chamada *Taxis* , por meio das sangrias , dos purgantes , dos relaxantes , sedativos locaes externos.

A situação he o primeiro cuidado , que o Cirurgião deve ter , e esta será horizontal , e perpendicular : na primeira se põem o doente na cama horizontalmente com o corpo inclinado sobre o lado

op-

opposto á hernia , com os lombos baixos , com o peito alto , e sustentado dos traveceiros , com a cabeça inclinada para o peito , com as nadegas mais altas que o peito , e que a cabeça ; com os joelhos dobrados , e especialmente aquelle , que corresponde á hernia. Esta posição põem em relaxamento os musculos do Abdomen , e facilita a redução da hernia com o Taxis.

Na perpendicular se coloca em sentido opposto : hum forte , e robusto ajudante se põem á borda da cama em sitio cómodo , abaixo hum pouco o corpo , attrahe a si o doente , e leva as pernas para as suas costas , até que o Poplite he chegado sobre elle , e as pernas pendem de traz das suas costas , se levanta pouco a pouco , abraçando ao mesmo tempo as coxas ao doente para levantalo em alto , de modo que o tronco esteja pendente , e a cabeça e o peito se apoiem sobre a cama , sostidos de traveceiros , a fim de dar ao corpo huma figura curva anteriormente , a fim que os musculos , e os seus aponeurosis , e fascialata estejam em relaxamento. A situação perpendicular faz , que as visceras do Abdomen carregem sobre o diafragma , e puxem perpendicularmente em baixo , aquellas que estão metidas no Sacco , e as livrem talvez do contrastante anulo : em tal posição deverá conservar-se o doente , seis , ou oito , ou dez minutos , e mais se as circunstancias o exigem. *Kesler Decis. de Hern. §. LV. pag. 26. Lovis Memoir del' Acad Roial de Chirurg. Tom. XI. pag. 432 : O Richter : accrescenta de não emprender nunca a opperação da hernia encarcerada se primeiro não tem sido intentada a reducção com o Taxis.*

O Taxis consiste em comprimir o tumor hernioso , manejando com deligencia para diminuir a gran-

grandeza, para que a viscera possa entrar out'a vez no ventre. Na hernia Inguinal pequena, o Taxis he muito simples; pois o Cirurgião não tem mais que comprimila com o dedo polgar, e o Index; mas na grande, e em aquella do Scroto a compressão, e os movimentos se fazem em huma direção obliqua debaixo ao alto para a crista do Osso Ilíaco, a fim de adaptalo á figura do anulo inguinal. Na hernia crural a compressão se faz em alto, e hum pouco dentro, tendo a perna hum pouco dobrada fora: na umbilical, de alto abaixo; e na ventral, rectamente para a columna vertebral.

Se com ajuda de Taxis não succede reduzir a hernia no ventre, se recorra immediatamente á sangria, a qual, ainda que não repare directamente o destroçamento, impede, minora, e suspende tambem as suas consequencias, e a inflamação, (isto he) a supuração, ou a gangrena. Esta será abundante, e proporcionada ás forças do doente, ao temperamento, e a vehemencia dos symptomas; para que se a dor for limitada unicamente á hernia, a sangria será mediocre; porém se depois se extender ao Abdomen com tenção, será abundante, e muito maior, e repetida, se o destroçamento for inflammatorio: *Vanswieten* nos seus commentarios. As pequenas, e repetidas sangrias, tem lugar nos destroçamentos chronicos, ou spasmodicos, e sómente quando a dor na hernia he constante. *Vede Monro Essais de Medecin. d'Edimburg. Tom. V. pag. 359.*

Então quando não se visse calmarem os symptomas depois da sangria, e não se pode-se reduzir a hernia com o Taxis, depois de esta, passasse immediatamente ao segundo socorro, não olhando para a pequenez do pulço, nem a palidês do rosto, nem a frialdade da cutiz; sendo taes accidentes proprios

prios das inflamaçoens , e das irritaçoens dos intestinos. Por isso quando a sangria produz hum pouco de alivio , o pulso faz-se mais forte , e com maior vibraçaõ , o rosto toma côr , e a pelle se aquece : observando-se innutil a sangria , se passa aos remedios purgativos : estes são de duas especies , huns se chamaõ purgantes , e se administraõ pela boca , e outros clisteres , e se daõ pela via do ano. Os que se tomaõ pela boca , não tem lugar no destroçamento agudo , nem nas hernias pequenas , por não augmentar a irritaçãõ , e a inflamaçaõ ; mas são de proveito no destroçamento cronico tendo mostrado a experiencia contra a opiniaõ de Arand. *Observationes Medico Chirurgicæ de Bells, & Pott Oevurs Chirurg. Tom. I. pag. 338.* de ter sido reconduzidos no ventre os intestinos destroçados depois da administraçaõ do purgante , como afirma Monro *Essais & observat de Med. d' Edimbourg. Tom. V. pag. 358.* o Sharp. acrescenta o dallo em pequenas dozes de tres em tres horas. *Recherch Critiq. &c. da Cirurg. pag. 29. le Grand.* mostra o exemplo , de ter livrado os intestinos destroçados com o uso interno do Sal d'Epsom *Memoir. del' Academ. Roial de Chirurg. Tom. XI. pag. 417 :* no destroçamento cronico os purgantes produzem bons effeitos , (isto he) amollecem as materias feçais demoradas na hernia chamando la dentro huma affluencia maior de humores , e acordaõ com seus estímulos o movimento menor vermicular dos intestinos sem damno algum , ou offensa por onde as fezes podem mais facilmente tornar a subir , e passar ao ventre com a desenchaçãõ , e tirar por este modo de embaraço o intestino ; assim como ultimamente vemos advertido dos AA. *Clasicos : vede le Grand Memoir del' Academ. de Chirurg. loc cit. Hevin Patolog. & Therapeut*

peut pag. 373. Quando se teme que o purgante possa mover, e produzir a flatulencia, e fazer inchar a hernia maiormente, se subministrará sobre os mesmos a casca de Quina, a fim que dita possa impedir o desenvolvimento do ar, e procurar huma maior energia nas fibras do intestino hernioso, onde as fezes por si mesmas, se movão, e tornem ao ventre. Entre os remedios purgativos se preferem os mais benignos, como a Jalapa com alguns grãos de Mercurio: *Monro op. cit. pag. cit.*: a infusão do Sene, o Sal de epsom especifico decantado de le Grand. ou de Inglaterra escolhido remedio purgativo se subministra em pequenas dozes: Por exemplo, se dissolve huma onça de Sal de Inglaterra em dez onças de agoa commum; cada dez ou doze minutos se lhe faz tomar huma colher ordinaria a fim de não irritar o estomago, e promover o vomito, que faria inutil o effeito do remedio. Se o doente não tivesse repugnancia ao oleo, se pôde unir ao sal huma onça, ou huma meia de Oleo de linhaça virgem, o qual minora a sensibilidade do estomago, lubrica as tripas, e favorece a acção do sal. No caso de muita sensibilidade do ventriculo, se une ao dito remedio hum grão de opio. Os emeticos igualmente convem, assim como a Ypecuacuanha dada hum meio grão cada meia hora, como se explica o Murrais nas palavras seguintes: *Emeticorum saltim eorum, quibus vulgatissime utimur, vis antispasmodica ulterius confirmatur methodo, quæ recentius invaluit ea tam parvis dossibus in veris, & exploratis affectionibus spasticis dandi, ut ne nausea quidem suboriatur.* Volum. II. pag. 274.

Logo que o purgante, ou emetico der signaes de querer obrar, que se conhece de huma comi-

xaõ na hernia, e do rugido das tripas se emprehen-
de o taxis para remover do intestino destroçado as
fezes amolecidas, e empurrallas ao ventre pela via
do anulo.

Duas sortes de clisteres se devem empregar na
hernia destroçada de proximo: os primeiros seraõ
emolientes, para evacuar, e livrar os intestinos
grossos das fezes. Estes leraõ feitos com a decocção
commum: onças 6, com mel puro duas onças, com
oleo de linhaça onças 3: e em menor doze, se o
doente he pequeno, ou de pouca idade. Depois de
duas horas se applicará hum segundo, e depois o
terceiro, se a hernia he pequena, ou o destroca-
mento he inflammatorio. Depois se passa aos esti-
mulantes para avivar o movimento peristaltico dos
intestinos, para tirar o destroçamento spasmodico.
Estes podem ser compostos com hum onça de fa-
baõ branco dissolvido em hum libra de leite, ou
com o electuario diacatolico, onças duas e meia
com o sal Ammoniaco, drachmas 3, com a decoc-
ção commum, onças 8, 9, ou 10, ou com a de-
cocção do sene; com o electuario de Jerapicra, hu-
ma onça, com sal commum, drachmas 3, 4, ou 5;
ou com a agua Benedicta do Rolando, ou com Tar-
taro emetico á doze de 4 grãos, dissolvido em 3,
ou 4 onças de agua. Com o uso destes remedios se
ha de continuar a opperação do Taxis; não po-
dendo-se obter a reducção da hernia, se passa ás
mézinhas mais estimulantes, como aquellas feitas
com o fumo do tabaco julgadas como especifico,
com as máquinas proprias, e conhecidas hoje de
todas as pessoas da Arte.

Em falta destas se póde supprir com dois caxim-
bos, hum se enche de tabaco, e se introduz no ano,
depois de têlo accendido, cujo canudo se unta com

oleo , depois se cobre a cabeça do caximbo com a outra se unem , e se asseguraõ as duas cabeças juntas com papel molhado , e se assopra com força no canudo do segundo caximbo , a fim de introduzir o fumo no intestino recto. L'Esitero recommenda o fumo do tabaco nas hernias destrocadas. *Institui. Chirurg. Tom. II. Cap. CXVII. pag. 67.* vêde tambem o *Daben Ratio medendi part. I. Cap. IX. pag. 64.*

A introducção do fumo se pôde continuar impunemente huma meia hora até huma hora , substituindo sempre novo tabaco a exemplo do *Pott. Oeuvre Chirurgical. Tom. I. Observat. X. pag. 455.* : se a introducção do fumo do tabaco não fosse bastante , se recorrerá a outras mézinhas feitas com a infusão das folhas do tabaco em doze de hum drachma deitada em huma libra de agua fervendo : os symptómas , que produz são huma languides , anxiedade , e suor frio , os movimentos convulsivos no ventre , na hernia , e a sahida do ar pela boca , e pelo ano ; para que os ditos clisteres sejam mais efficazes , se porá o doente immediatamente depois da mézinha em meio banho , e ao chegar dos symptómas tentar a opperação do Taxis. Se tudo isto não bastar para a reducção da hernia , se examine com attenção o doente , e descobrindo nelle maior desinquietação do corpo , tenção , e fraqueza no ventre , e na hernia com movimento febril , he preciso suspender tudo ; por não ver gangrenar-se a hernia , e morrer o doente. Quando porém fosse a hernia Omental , sómente os ditos clisteres de tabaco não são de nenhuma utilidade ; em tal caso a compressão só feita com as mãos continuadamente por muitos dias , succede reconduzir o Omento na cavidade , e he confirmado isto na prática de muitos

ros Professores, e particularmente do Arnaud. *Memoir. de Chirurg. Tom. II. Art. XI. pag. 514. Tract. des Hern. Tom. II. Obsv. III. pag. 135.*

Quando se praticaõ os remedios já citados não se haõ de esquecer os relaxantes, e os sedativos; o oleo de amendoas doces, fresco, ou de Niza, de Luca, ou de linhaça puro, sempre tem produzido bons effeitos subministrados em pequenas, mas frequentes dozes. Os sedativos são uteis em todos os destroçamentos, especialmente no spasmodico: porém quando vem administrados nos primeiros tempos do destroçamento *Gunzius Tract. de Herniis pag. 36.* Se podem usar interna, ou externamente; e em mézinhos: se dará o ópio com preferencia de outro qualquer sedativo mais brando, hum quinto, ou hum quarto de grão cada quarto de hora, só, ou misturado com o dito oleo, ou com agoa de toda a Cidra, ou com agoa fria: não se esquecerá o uso interno tambem da Ipicacuanha principalmente no destroçamento spasmodico á doze de meio grão com assucar cada meia hora; sobre a regiaõ do estomago, se applicará o emplastro estomaguico, feito de triaga com 5, 6, ou 8 grãos de ópio; ou com o ceroto de Laudano huma onça; ou canfora scrop. hum. Os Clisteres serão da decocção de Camulilla com 15, 20, e ainda mais grãos de musgo, ou com 4, ou 6 grãos de ópio. Logo que se descobre, que os sedativos produzem o seu effeito, procurado ao doente hum pouco de somno, e o socego dos symptómas, precisa fazer o Taxis para repôr a hernia *sividerimus*, diz de Haen, *opio quietem talem inductam, tentabimus repositionem fors futuram nunc faciliorem. Instit. Patholo Tom. II. pag. 299.*, assim que produzaõ hum bom effeito os ditos Clisteres lie necessario livrar os intestinos das fezes com

as mézinhas evacuantes ; e no caso do destroçamento inflammatorio , não usar dellas senão depois de feita humã , ou mais sangrias.

Em quanto a remedios externos se empregão entre os intervallos do descanso , e da applicação dos ditos foccorros debaixo da fórma do fomento , de cataplasmas , e de banho , e de unção. Tem nascido questaõ entre os Authores a respeito da qualidade destes , e do modo de usallos. Muitos são de opiniaõ , que sejaõ sempre emolientes , e applicados quentes para relaxar a fibra tendinosa dos espiraes do ventre ; outros não prescrevem se não os repercussivos , e frios : *Beloste Chirurg. de l'Hospital chap. des Hern. pag. 156.* : suppondo , que nas inflamações os vasos se tenham já alargado da rarefação do sangue , e que o medicamento quente deve necessariamente augmentar a inflamação , ou a grandeza do tumor , rarefazendo o ar. Sobre taes principios ; huns , e outros tem cahido em dois extremos com prejuizo notavel dos doentes. Para não cahir em semelhantes erros , indicarei os casos nos quaes convenhaõ os emolientes com preferencia aos repercussivos. Sempre que o destroçamento he inflammatorio , não he bom valer-se dos repercussivos , e frios , porque fixaõ o sangue nos vasos , suspendem a circulaçaõ , e movem a gangrena da parte promptamente ; assim como tem sido observado tanto nos antigos como nos modernos : vêde *Hippocrates Aphor. 17. e 20. Sect. V. Galenus Method. meden. lib. XIII. Cap. VI. Sharp. Recherch critiq. Heister Gortier Chirurg. Repurgat. num. 1520. Goursaud Memoir. de l'Acad de Chirurgia Tom. XI. pag. 407.* Não se devem tratar as hernias com as coulas frias nos symptómas mais fortes , mas sim depois de estar em foccego , com que parece mais
op.

opportuno nos casos indicados valer-se dos banhos tépidos feitos comervas emolientes, ou daquelles recommendados por De Haen, compostos com aveia pizada, cozida muito bem em partes iguaes de agua, e leite, ajuntando-lhe no fim a flor de sabugo, de Melliloto, e de Camumilla, de cada hum dois *manipulos Instit. Pathol. Tom. II. pag. 295.* estes banhos se estenderão sobre todo o abdomen, e a roda da circumferencia da hernia, e sobre o tumor hernioso serão pouco tépidos, sendo muito prejudicial hum maior gráo de calor. Se a hernia he de natureza inflammatoria, será bom ungir o ventre com o lenimento volatil, composto de huma parte de espirito de sal ammoniaco, e de seis de oleo de amendoas doces, ou do commum, cobrindo depois o ventre com huma fomentação de flores de camumilla, e de semente de linhaça com a addição do oleo de Jusquiama, ou de camumilla, e se renova logo que esfria. Estes remedios são considerados como espicificos do celeberrimo Alemao *Richter* para impedir, e diminuir a inflammação. Os repercussivos são saudaveis no principio de qualquer destroçamento intestinal, e ainda no chronico adiantado, e depois das opportunas sangrias, e da evacuação das fezes dos intestinos grossos. A agua fria só, ou com vinagre he o repercussivo de que uso, e tambem póde-se praticar a fomentação de *Schumker*, Professor Turdesco, o qual usava nas lezões da cabeça, com a commoção do cerebello: isto se faz com o vinagre optimo onças 12, nitro puro onça e meia, sal ammoniaco onças 2; dissolvido em doze onças de agoa pura: outros louvaõ a agua de Goulard. O espirito de Mindirero, o vinagre de Litargirio, o vinho tinto, *Monro Essais d'Edimburgo*: a agua
fria;

fria; porém obra mais sensivelmente, e de hum modo muito energico: Arnaud he do mesmo parecer *Tract. des Hern. Tom. I. pag. 92.*: o frio da agua facode as fibras musculosas, e as membranas componentes do scroto, e do sacco hernioso, e o obriga ao encolhimento, e a contracção, e a pressão, que soffre o ar contido na porção destrocada, a obriga a tornar a entrar no ventre com a diminuição do tumor. A sensação de que o intestino he mais, ou menos batido desperta, anima, accresce, e restaura o perdido tom; e por hum spasmo saudavel succede alguma vez, que o colon, e o recto se evacuaõ espontaneamente das fezes, cuja evacuação he de hum bom indicio para o doente, e para a hernia, que mais facilmente torna a entrar. Finalmente a impressão da agua fria se estende até aos vasos sanguineos, que distribuindo-se sobre o celindro intestinal, lhe faz recuperar pouco a pouco o perdido vigor natural, e o humor vital he sacudido com mais viva energia, que primeiro para as partes sãs; pelo que se impede, e se retira, ou se diminue na parte destrocada, o perigo da inflamação, Lombardi na sua *Memoria sobre a propriedade da agoa fria, Thedin Progres ulterieur da Chirurg. Sect. XV. pag. 124.*: O methodo de usar a agua fria, he de entornalla sobre o tumor com abundancia, ou com os xumaços, os quaes se renovaõ logo, que principiaõ a aquecer-se; outros administraõ nas lavagens frias, a applicação da neve, e do gêlo. *Petit Tract. des malad Chirurg.* O dito banho deve continuar-se por muito tempo, até que se observe o allivio dos symptomas: se estes ainda resistem iguaes, ou crescem, ou se exasperaõ, o banho frio se suspende por não accelerar a gangrena.

Da Opperação do Bubonocelle , e da necessidade de emprehendella.

A Opperação do Bubonocelle deve emprehender-se , quando a hernia não pôde ser reconduzida no ventre com os meios indicados , ou quando os symptómas do destroçamento subsistem depois da reducção. Esta consiste em abrir o scrôto , e o sacco da hernia , em dilatar , ou cortar o anulo inguinal , o cólo do sacco , em repôr as vísceras herniosas , e remediar a lezaõ destas , e dos symptómas consecutivos ; e assim como depende da habilidade do Cirurgião , e das luzes que tiver , aproveitar o tempo opportuno para emprehender a opperação ; assim eu julgo dar-vos algumas regras sobre as quaes possaes determinar-vos a executallo felizmente.

A necessidade de emprehendella se deduz da natureza dos symptómas , e das espécies do destroçamento , dos effeitos dos remedios , e das forças do doente.

A natureza dos symptómas he aquella guia que conduz os Cirurgiões a emprehender tarde , ou cedo a opperação ; se estes são leves , e lentamente crescem com intervallos de sucego , não se recorra promptamente a opperação ; porém se ao primeiro instante os accidentes apparecem vivos , grandes , e cessem com vigor , e o tumor hernioso se faz mais doloroso debaixo da compressão da mão , ainda que ligeira , faça-se logo a opperação. *Morand. Opuscul. de Chirurg. Tom. II. pag. 160.* Como tambem , quando a dôr se tenha limitado só á hernia , sendo este hum final da immediata gangrena.

Faz variar muito o tempo de fazer-se a opperação a especie do destroçamento : as herniãs antigas , e grandes , e que tem estado repostas mais vezes

zes depois de destroçadas, não correm o perigo de inflammarem-se, e gangrenarem-se com brevidade; e por isso a opperação póde ser differida por algum tempo. As hernias novas, as pequenas, e aquellas que de novo apparecem, depois de ter estado sôstidas por largo tempo no ventre pela funda, quando estão fechadas do anulo, geralmente se gangrenão em pouco tempo, e mesmo em poucas horas, como succede mesmo no destroçamento inflammatorio.

Os effeitos dos remedios dão luzes para regular-se a respeito do tempo de fazer a opperação, quando estes tem sido empregados no modo que disse, e não se vê aquelle proveito, que se deseja, se emprehende a opperação, a qual deverá suspender-se no caso, que produzissem o allivio dos symptómas, e a diminuição do tumor hernioso.

As forças do doente determinarão de differir, ou emprehender promptamente a opperação; póde ser retardada a dita, quando a hernia nasce pouco a pouco em pessoas debeis, porque empregão muito tempo antes de dar os sinaes de hum grande destroçamento, e dão tempo de applicar os remedios convenientes, como pelo contrario aquellas, que se descobrem em pessoas robustas, e de meia idade, se inflammaõ, se gangrenão com muita facilidade, e por isso se passe immediatamente á opperação, como tambem quando as forças principiaõ a faltar, ou pe'a idade, ou pelo vômito obstinado, a fim de que não morra o doente pela extrema falta de forças.

Conhecida que seja a necessidade de fazer a opperação do Bubonocelle, não se tarde a pô-la em execução: primeiro de tudo he preciso dispôr os preparativos, e depois a situação do doente; o
pre-

preparativo consiste em hum bisturi recto , e hum tenta fulcada , aguda na ponta em hum pequeno gancho agudo , em hum pequena pinça de ponta obtusa , firme no seu cabo , n'hum tífoura , n'hum quantidade de fios seccos , hum globosinho de panno de linho a modo de hum botaõ , assegurado a hum fio comprido nos chumaços , e ligaduras. A situação do doente será horizontal , a borda da cama com os lombos baixos , com o peito , cabeça , e nadegas altas , com o joelho dobrado , que corresponde á hernia , e em tal posição se faz ter o doente firme , e immovel dos opportunos ajudantes. O modo Inglez de atar o doente a hum banca , augmenta o terror da operação , como adverte *Mr. Lensis Memoir de l'Academ. Royal d'Chirurg. Tom. XI. pag. 446.*

Posto o doente em tal situação se faça urinar , e se lhe rapaõ os cabellos , e depois se principia a operação. Tratando-se de hum Bubonocelle , ou enterocelle , que seja se levantaõ os tégumentos de forte , que forme hum dobradura transversal á cutis correspondente ao centro do tumor ; hum das suas extremidades será sustida com dois dedos de hum assistente , e a outra do Professor , o qual corta com o bisturi de córte recto o centro da dobra transversalmente ; a qual se vá levantando no tempo que a divide , a fim de fazer hum córte mais comprido sem offender o sacco. He raro , que com este córte se possa dividir de cima até abaixo o scroto sem tocar no sacco ; para isso se recorra á sonda fulcada , a qual se empurra na cellular entre acutis , e o sacco correspondente ao angulo superior da ferida , e pelo sulco se faz correr o bisturi para fender acutis hum meia pollegada , além do ano : ao depois volta-se a sonda ao angulo inferior , e se

vide o remanente do scroto : succedendo que acutis do scroto esteja destendida , subtil , e firme ao sacco , se faz a dobradura sobre o anulo , como vem prescripto de muitos em todo o caso para abrir o scroto de alto abaixo ; por este meio se põem em liberdade o sacco para podê-lo abrir mais facilmente ; as visceras herniosas depois da sua abertura cahem debaixo dos sentidos , e se reconhece melhor seu estado , e se poupa a repetição de novos córtes ; aberto o scroto , se presenta a cellular ; antes de cortalla se examina a situação do cordão spermatico , a fim de não ferilo , ou cortallo totalmente ; depois desta advertencia se descobre em alguma parte o sacco , tirando , e cortando a cellular , que está sobre , se levanta esta com humas pinças o mais alto que seja possível , e se corta com huma faca posta horizontalmente sobre o sacco. Se fazendo os ditos córtes salta-se o sangue , hum ajudante o enxugará com fios molhados na agua stitica clementina , ou na de arquebus , ou no espirito de vinho , ou tomará o vaso com os dedos , a fim de não retardar-se a operação.

Despida pouco a pouco da cellular hum pequena porção do sacco , o qual se conhece pelo ver lizo , igual , e resplandecente , se examinará com attenção para ver a sua espesura , e dureza : esta advertencia põem em segurança o Professor para regular-se nas suas incisões , a fim de não precipitar com a faca sobre as visceras conteúdas. Quando porém no sacco estivesse muita agua , não se precisa de tantas cautellas podendo-se abrir , como diz *Petit* : do mesmo modo de hum abcesso. *Trait. des Malad. Chirurg. Tom. II. pag. 363.* Para abrir o sacco , quando não está muito tezo , he bom fazer hum dobra transversal ao mesmo , semelhante á-
quel-

quella da cutis ; e em caso diverso assecurallo com humas pinças , ou com hum ganxinho no lugar donde tem sido tirada a cellular , e se puxa assim quanto se póde , e se faz nelle hum pequena abertura com a ponta posta horizontalmente perto do Instrumento que a sustem ; pela qual abertura sahe hum humor , ora soroso , ora escuro , preto , e fedorento ; e esta diversidade depende da maior , ou menor alteração , inflamação , ou principio de gangrena das partes destroçadas. Este he o methodo mais simples , e mais seguro com preferencia de tantos outros usados dos práticos , e esportos Professores : aberto o sacco se introduz na pequena abertura a sonda sulcada , e se empurra para baixo para o fundo do scroto ; e assecurando-se com o dedo , que não se acha nenhuma porção de viscera entre o sacco , e a sonda , se leva a faca no sulco para abrir o sacco , e dividilla até o angulo da ferida dos integumentos , e isto feito se introduz o dedo index esquerdo dentro do sacco , e empurrando-o superiormente para o anulo com a guia do dedo , se divide o resto quasi até o anulo , para deixar ileza hum porção do cólo do sacco. Este methodo he contra a authoridade dos antigos , e de alguns modernos , e do Bells ; mas eu o acho muito util para conservar intacta , e illesa hum porção do sacco , como hum seguro meio para guiar os instrumentos contra a parede do sacco , entre o annulo , e as visceras herniosas , que servem a dilatação , ou corte da fexadura : depois tomando hum porção do sacco com o polegar , e index , e attrahindo-a assim em alto , alarga-se a via notavelmente , por donde alguma vez succede levar a ponta do dedo no anulo mesmo , cuja vantagem não se tem seguindo o methodo de abrir todo o sacco.

Aberto o sacco, o intestino sahe, e se retroce; quando porém não fosse fechado do Omento, e adquiere hum volume maior; que parece que nasce do ventre; e dependendo isto de liberdade, que acha o intestino de despregar-se, e extender-se; em tanto se leva o dedo index no sacco, para indagar a razão do destroçamento, se depende do cólo do sacco, ou do anulo. Se se deriva do cólo, se conhece da liberdade, que acha a ponta do dedo de penetrar no anulo: então se tenta de reduzir as visceras herniosas; porém quando o sacco não fosse calloso, ou restringido, sem pouco, ou nada tocar no anulo ao fazer disto, se toma o intestino com o index, e polegar molhados em oleo, o mais perto que se póde ao anulo, e se tira fóra hum porção delle com muita doçura, por não molestalo, se comprime com os mesmos dedos de hum, e outra banda, levando-o para o anulo, para fazer tornar a entrar no ventre o ar, ou as fezes demoradas no intestino hernioso, a fim de diminuir a grandeza: em quanto se tira assim o sacco, como disse, com a ponta do index da outra mão, se empurra no ventre o intestino para a espinha do Ilio com o sentido de fazer tornar a entrar primeiro aquella parte, que foi a ultima a sahir. Quando fosse hum *entero-epiplocelle*, o intestino deve ser repulsado adiante do Omento. Se no exame se sente com o dedo o anulo resistente, e estreito, que não lhe permite de penetrar, he hum prova que elle he causa do destroçamento, e assim se passe immediatamente a abrir o anulo inguinal. Para executar isto se leva o dedo index esquerdo debaixo da volta superior daquella porção do cólo do sacco, que se deixou illezo, se empurra adiante, e dentro do anulo tudo aquillo, que póde entrar sem esforço,

e sem causar dor grave, e com a guia do dedo assim como o prescreve o *Sharp. Recherch. Crit. p. 38.* Se faz correr a faca obtusa em ponta com o corte voltado para cima, se empurra adiante para fazer penetrar a ponta no anulo entre o dedo, e amargem do anulo; á proporção, que a ponta da faca vai avançando, se abaixa devagarinho o cabo, a fim de que a sua parte cortante se entranhe, e se chegue melhor a parte interna do Peritoneo; depois se levanta hum pouco o cabo para cima, se empurra adiante a folha para cortar o anulo superiormente, e ao mesmo tempo se empurra adiante o dedo introduzido no annulo para cobrir com elle a faca; no acto da incizaõ do oponeurosi do musculo obliquo, os doentes são agitados de hum dôr vivissima, a qual pôde fazer crer de haver ferido algum nervo. Este symptóma he inevitavel; mas de nenhuma consequencia: em respeito á direcção da incizaõ do anulo ha muitos pareceres; mas eu me tenho achado mais satisfeito, cortando-o para cima, e para a parte da linha branca; tanto para não offender a arteria epigastrica, como tambem porque cortando-o para o embigo, e para a linha branca se cortão transversalmente as fibras aponeuroticas do musculo obliquo externo; e cada pequeno corte basta para desfazer o destroçamento, e facilitar a entrada das visceras destroçadas no ventre. A grandeza de taes incisões deve ser regulada á proporção do tamanho da hernia destroçada. O Nuchio foi dos primeiros, que propôz o dilatalla sem cortalla; e o *Flevemin e Arnand Traçt. des Hern. Tom. II. pag. 193.* aconselhaõ hum instrumento dilatador de dois gumes; executando tudo quanto tenho dito, até aqui se devem ter outras cautellas de suma necessidade.

Primeiramente examinar as vísceras se estão sãas ; se o Omento se oppõem á reposição do intestino , se inflammado , se unido ao sacco , se engroçados , se separados , se gangrenados : se está saõ , se reconduz immediatamente no ventre levando os dois dedos indices perpendicular , e successivamente sobre o intestino muito visinho ao mezenterio ; usando de outras cautelas acima indicadas. A ferida se cura com muita simplicidade , cubrindo-a sómente com fios muito finos , sustida dos chumaços convenientes , e a ligadura T : antes do quarto dia não se renova o apparelho , o qual será sempre de fios unicamente , e banhos emolientes ; o governo do doente será pô-lo na cama immediatamente em posição horizontal com as nadegas altas , e o resto do corpo baixo , e se lhe fará tomar alguma colher de agoa Triacal , ou de hortelã com o laudano líquido do Sidinamio , se as forças são abatidas , e calmar o enfado do estomago ; depois se lhe applicará a sangria , e outros remedios suggeridos , se as circumstancias o exigirem.

O Omento algumas vezes se oppõem á reposição do intestino no ventre ; porque o cobre , e envolve a modo de sacco , e porque se tem feito scirroso , e o comprime : no primeiro caso se deve desenvolver hum do outro com os dedos molhados em oleo , e depois tornar a metter o intestino , e depois o Omento : no segundo caso vai tirada a uniaõ do intestino com o Omento , a fim de dar a liberdade ao intestino ; e quando não se podesse obter , se abre o Omento na parte interior a modo do sacco herniario , e depois se repõem o intestino , e o Omento cortado se deixa pendente fóra do anulo , a fim de que possa pouco a pouco retroceder , e poupar a ligadura dos vasos em caso de emor-

emorrogia, já praticada do Beichert : no terceiro caso se não se observa no Omento mais que hum pequeno nó, ou mais; porém não muito duros, e o resto do Omento está são, e se repulsa no ventre para que o calor, e o humido natural desta cavidade possa a pouco e pouco desfazer taes durezas, como deixou escrito o Bells : a scirrosidade grande do Omento não se remetta, mas sim se destrúa toda com a tizoura, e sem ligallo, como adverte *La Faye Chirurg. Dionis. pag. 346., not. a, e Garen-gest.* Sendo a tal ligadura algumas vezes damnosa : outros aconselhão de não demolirem a dureza scirrososa, mas sim deixar o Omento pendente na hernia, outros de deitallo sobre o ventre, e depois cobrillo com hum panno, medicar a chaga, e obrigar o doente a deitar-se de costas; pois tem succedido, que o Omento morbofo supura, e se destaca perto ao anulo, e a parte restante torna a entrar, e se une e forma varios pontos carnosos, os quaes concorrem a formar huma mais segura cicatriz. Succede algumas vezes de achar as visceras destrocadas de huma côr encarnada, e escura, que pôde fazer crer proxima a gangrena do intestino; huma tal crença he falsa, e por isso se introduza sempre no ventre toda a vez, que o intestino tenha a sua natural consistencia, firmeza, e brandura : quando as visceras tem sido inflammadas, ou não depostas de muito tempo, se lhe segue huma uniaõ entre viscera, e viscera, ou qualquer parte do sacco, por causa de huma materia viscosa, ou de fiosinhos, os quaes são fibrosos, cellulosos, ou esponjosos; tal uniaõ he patente quando o Cirurgião tem a cautela de examinar o estado das visceras, antes de as reduzir no ventre : Quando he motivada da materia viscosa, se tira passando a ponta do

do dedo index com cautella entre viscera, e viscera, o entre esta, e o sacco. Se a uniaõ he feita por via dos fios, se recorre a sonda de feitio de folha de mirto, ou de figura clietica na extremidade comprida quatro, ou sinco linhas com a circumferencia obtusa, e tambem a faca, ou tífoura para cortar os cabos. Quando porém estes fossem duros, que não podessem quebrar com os dedos: Succede que estes fioszinhos carnosos selulosos, ou fibrosos, fazem as visceras de tal forte adherentes ao sacco, ou entre si, que não he possível poder desunillas, sem gravissimo perigo; em tal caso aconselhaõ alguns prácticos, e particularmente o *La Faye nas suas notas ao Curso de Operações do Dionis. pag. 348.* de não separallas, mas lómente de alargar o anulo com huma proporcionada incisão para livrallas do destroçamento: depois cobre a parte com fios, e a deffende com huma bolça de lata; sitúa o doente de costas voltadas com as nadegas altas, emprega os laxativos brandos, e huma rigurosa dieta. Com esta prática se alcança, que as visceras durante a cura com o favor da supuração, a pouco a pouco se sepáraõ, e se retiraõ no ventre. A's vezes o engroçamento enche toda a circumferencia do intestino por onde a sua cavidade he muito estreita, que não admite a passagem ás fezes; entaõ a unica ressurça he aquella de demolir toda a porção intestinal morbosa, e remediar a ferida do intestino com a cozidura do ponto por cima, como eu mesmo estive presente em hum caso tal, operando hum dos mais célebres Professores da Europa: As hernias são sujeitas ás vezes a supuração, a qual he sómente propria do Omento. Se a materia he recolhida em hum, ou mais saccos, se abrem com a lanceta a modo d'hum abcesso ordi-

di-

dinario. Se acafo he lezo, vicioso, corrompido em toda a sua substancia vai demolido com a tífoura. Não raras vezes succede a gangrena das vísceras nas hernias encarceradas; e esta pôde fer, ou da membrana só externa, ou de todas. Quando he só da externa, se torna a metter o intestino no ventre depois de havê-lo tirado hum pouco fóra, e de haver passado hum fio com a ajuda de huma agulha no mesenterio immediato ao intestino, para o que, se a parte gangrenada se sepára, ou se rompe, estando já na cavidade, as fezes se entornaráõ no ventre, o que não succede quando a parte gangrenada do intestino se conduz ao anulo, e se lhe conserva mediante o fio seguro sobre o ventre por meio de duas tiras de ceroto. Se huma parte do intestino he grangrenada em toda a sua substancia, se observe se he livre, ou unido ao anulo; se he livre, se fexa o anulo no modo já dito com a cozidura, demolindo com a tifoira a parte gangrenada, e depois se procure de descarregar o intestino das fezes com as mézinhas emulientes. Depois da evacuação das fezes se procure, que a abertura do intestino corresponda ao anulo, porque as fezes não se espalhem na cavidade. A dieta seja rigorosa, e, se as forças são poucas, recorrer-se-há á quina dando-lha em pó alguns drachmas no dia. As mézinhas sejam sempre emulientes ao número de duas por dia, e a ferida curalla com os fios unicamente, e os chumaços molhados em huma decoção forte de quina, e lavada com a agua de malvas tépida, e hum pouco de vinagre, a fim de evitar a erisipella, e a escoriação que as fezes poderiaõ produzir. Se depois o intestino estivesse gangrenado em mais partes, e arraigado ao anulo nada se faça; mas se ainda he livre, se trate como affima disse, com a

differença, que os pontos do mesenrerio haõ de ser na maneira dita, mas hum a cada huma parte do intestino cortado, se passaõ na cellular do anulo para maior segurança, e depois se voltaõ os fios sobre o ventre, e se fugeitaõ com huma tira de feroto. Feito isto se prescressem purgantes ligeiros já indicados, e mézinhas, e se faz o curativo como assima já disse, e, se depois do uso interno, e externo da quina ameaçasse de adiantar-se a gangrena, se molharáõ os fios no espiritõ de trementina: *La Peyronie Memoir. de l'Academ. de Chirurg. Tom. II. pag. 174.* A cura depois succede em tal caso pela uniaõ que contrahe o intestino ao Peritoneo além do anulo, a qual membrana he aquella que cobre depois, e fecha a perdida substancia intestinal.

Nas gangrenas grandes não se espere a cura como nas já ditas, porque para a reuniaõ do intestino he preciso huma das operações radicaes, e estas executallas segundo as circumstancias, e o mal o pede. Muitos modos tem sido inventados para procurar a reuniaõ do intestino, a saber a cozigadura unitiva. O ponto do cozigadura ao mesenterio, a invaginação da parte superior do intestino na inferior: a introducção de hum pedaço de Trachea, a invaginação do intestino com hum bocado de papel. A cozigadura unitiva he a mais facil, e mais simples; ha alguns annos, que se usava aquella já dita do ponto por cima: hoje he aquella enfiada. A primeira fecha as bordas do intestino n'huma maneira pouco cómoda, mas a cura he mais segura, como tenho experimentado varias vezes: a segunda restringe, e minora o diametro do intestino pelo qual o volvo he mais facil.

O ponto da cozigadura ao mesenterio he invenção do Senhor *La Pyronie*; mas por ser sujeito a
inui-

muitos inconvenientes não foi acceito dos Práticos.

A introduccão de huma extremidade do intestino na outra, he da invenção do *Ramdhom*.

Se introduz aquella parte do intestino, que pertence ao ventriculo na inferior. Se fexa o intestino immediato ás margens da divisa, com dous, ou mais pontos feitos com huma agulha ordinaria, munido de hum fio unico se repõem as visceras no ventre, tendo-as contra o anulo, e se fixaõ a extremidade dos fios na fórma já dita. Este methodo tambem se deixou em abandono ainda que o Senhor *Lewis* fosse quem o sustentava. O Senhor *Verger* corrigio os ditos methods introduzindo no intestino hum pedaço de de Trachea secca de Pato do comprimento de tres, ou quatro dedos transversos bem macerada, e enlopada no vinho quente, e depois se passaõ, segundo o seu comprimento na parte do meio, e a igual distancia tres fios munidos em cada extremidade de huma pequena agulha curva. Se mergulha a Trachea no balsamo del Perú, ou do Commendador, e se introduz no intestino com acautella, de que a parte membranosa corresponda ao mesenterio, se fura a extremidade superior de dentro para fóra, tres ou quatro linhas longe da sua orelha com as tres agulhas, e o mesmo se faz ao inferior com outras tres agulhas; feito isto hum Ajudante chega, e une a extremidade do intestino hum com outro; o Cirurgião dá hum nó a huma pequena distancia do intestino, mette as partes no ventre, retém os fios pela parte de fóra, e regula o doente como já se disse; depois de alguns dias se cortaõ, e se retiraõ os fios, e a Trachea he deitada fóra do ano molle, e quasi dissolvida.

O *Ritsch* propõem em lugar da Trachea hum
ce-

celindro feito de cartas de jogar , envernizado de oleo de Trementina , e depois molhado no oleo de Yperico.

Na gangrena do Omento não se precisa de tantas cautelas , mas se deve cortar a parte gangrenada deixando-lhe huma pequena extremidade unida á sãa , e depois se reconduz no ventre , abandonando-o totalmente a natureza.

Todos os Authores , que trataõ das hernias fallão do anõ artificial : por este se entende humã abertura posta no lugar da hernia , da qual se descarregãõ continuamente as fezes. Isto se fará quando humã porção consideravel do intestino tenha sido demolida , e que as duas extremidades não se possaõ conservar unidas com os referidos meios. Antes que tudo he necessario distinguir a porção superior da inferior ; e para isto se lhe faz tomar ao doente o oleo pela boca , e aquella parte por donde sahir o mefino se julgará ser a superior ; e esta se fecha com algum ponto de cozidura o mais immediato sobre a sua extremidade , se passa o fio na cellular visinha , e se assegura sobre a pelle com humã tira de feroto. A parte inferior propõem alguns de assegurá-la ao anulo , a fim de descarrega-lo das fezes com os Clisteres , e depois deixa-las cahir na cavidade ; outros pois a abandonãõ inteiramente , e a cura local será igual á que está já proposta.

Quanto tenho dito neste discurso me parece , que poderá ser bastante para satisfazer aos vossos desejos ; espero que mediante ás vossas observações , me ministrareis luzes superiores , a fim de ser mais perito nesta parte da Cirurgia , o que me constituirá em eterna obrigação para comvosco.

